

Libellés	Filière de prise en charge	Nombre de lits	Durée Moyenne de Séjour	Moyenne âge	Type de population	Prévalence des troubles cognitifs
SCHIRMECK	SMR Polyvalent	81 lits	40,31	81,63	Gériatrie polypathologique : rééducation fonctionnelle, affections post-chirurgicales d'origine traumatique des membres inférieurs et supérieurs, présentant des troubles de la marche, des défaillances d'organe, des pathologies cancéreuses, des troubles des fonctions cognitives ou en fin de vie et nécessitant un accompagnement. Perte d'autonomie du patient.	Troubles cognitifs réguliers (début d'alzheimer) et troubles de la déglutition. Part aléatoire en fonction des patients accueillis. Environ 20%
ILLKIRCH	CARDIO	14 lits	27,55	69,12	Séjours assez court Pas de troubles de la déglutition, très peu de troubles cognitifs. Patients avec le plus d'autonomie Hypertension artérielle	Quasi inexistants
	PNEUMO	20 lits pneumo + 8 lits insuf respi graves	29,19	69,45	Patients + agés. Maladies chroniques 8 lits IRG : respi, trachéo (troubles de la déglutition) Patients diabétiques	Quasi inexistants
	NUTRITION	16 lits	42,75	52,87	Obésité et patients dénutris pris en charge Patients diabétiques, cholestérol, hypertension, etc.	Quasi inexistants
	NEURO AVC	28 lits	68,93	63,10	Patients hémiplegiques, et comorbidités associées Troubles de la déglutition importants	Troubles cognitifs ++
	NEURO TC	20 lits	77,53	49,39	Patients hémiplegiques, et comorbidités associées Troubles de la déglutition importants	Troubles cognitifs ++
STRASBOURG	LOCOMOTEUR Appareillage amputation	18 lits	56,11	66,61	Patients diabétiques, hypertension, hypercholesterolemie	Rares (5%), chez les patients agés
	LOCOMOTEUR Traumatologie orthopédie	32 lits	32,95	57,47	Quelques patients agés, diabétiques Rares troubles de la déglutition	Rares (5%), chez les patients agés
	NEURO Médullaire, tétraplégie, paraplégie	25 lits	64,78	49,87	Rares patients avec trachéo et troubles de la déglutition Quelques patients diabétiques	Quasi inexistants
	PÉDIATRIE	7 lits, hospitalisation du lundi matin au vendredi après-midi uniquement	N/A (retour week-end) neuro : environ 2 à 3 mois loco : environ 1 mois	13,84	Patients locomoteur, neuro Troubles de la déglutition et diabète	Quasi inexistants

