

PDC 26 PRODUITS DE CONTRASTE

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative
1		PDC HEXA-IODE NON IONIQUE ISO-OSMOLAIRE (270 mg d'iode/mL)		
1	1	Flacons – 20 mL		350
1	2	Flacons – 100 mL		130
2		PDC HEXA-IODE NON IONIQUE ISO-OSMOLAIRE (320 mg d'iode/mL)		
2	1	Flacons – 50 mL		380
2	2	Flacons – 100 mL		1 050
2	3	Flacons – 200 mL		5 000
3		PDC TRI-IODE NON IONIQUE DE BASSE OSMOLALITE (concentration à 180 mg d'iode/mL)		
3	1	Flacons – 10 mL		100
4		PDC TRI-IODE NON IONIQUE DE BASSE OSMOLALITE (1) (concentration à 300 et 350 mg d'iode/mL)		
4	1	Flacons de 300 mg d'iode / mL – en 10 mL ou 20 mL		80
4	2	Flacons de 300 mg d'iode / mL – en 50 mL		700
4	3	Flacons de 300 mg d'iode / mL – en 100 mL		850
4	4	Flacons de 350 mg d'iode / mL – en 50 mL		70
4	5	Flacons de 350 mg d'iode / mL – en 100 mL		12 000
4	6	Flacons de 350 mg d'iode / mL – en 200 mL		600
4	7	Flacons de 350 mg d'iode / mL – en 500 mL		3 000
4	8	Flacons de 350 mg d'iode / mL – en 700 mL		200
5		PDC TRI-IODE NON IONIQUE DE BASSE OSMOLALITE (2) (300 et 350 mg d'iode/mL) - pour patients allergiqu		
5	1	Flacons – en 20 mL et/ou 50 mL (pour patients allergiques ou intolérants aux produits retenus sur le		200
5	2	Flacons de 350 mg d'iode / mL – en 100 mL (pour patients allergiques ou intolérants aux produits ret		200
5	3	PSE: autres volumes en flacon de 350 mg d'iode / mL (pour patients allergiques ou intolérants aux pr		0
6		PDC pour I.R.M. - acide gadotérique		
6	1	Seringue 10 mL		750
6	2	Seringue 15 mL		2 350
6	3	Seringue 20 mL		1 950
6	4	Flacons 10 mL		300
6	5	Flacons 15 mL		1 500
6	6	Flacons 20 mL		3 600
6	7	PSE: autres volumes		0
Nombre de lignes 24				