

Annexe 4.2 : Populations en métropole, fréquences de services des aliments pour les enfants scolarisés, les adolescents et les adultes

FREQUENCE DE CONTRÔLE

Chaque composante d'un menu est concernée par plusieurs critères (cf. cases blanches). Les fréquences observées sont à reporter dans les cases blanches et à comparer aux fréquences recommandées.

| Période du ... au ... (au moins 20 repas) | Entrée | Plat protidique | Garniture ou accompagnement | Produit laitier | Dessert | Fréquence recommandée |
|--|---------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|--|
| Entrées contenant plus de 15 % de lipides | | | | | | 4/20 maxi |
| Crudités de légumes ou de fruits, contenant au moins 50 % de légumes ou de fruits | | | | | | 10/20 mini |
| Produits à frire ou pré-frits contenant plus de 15 % de lipides | | | | | | 4/20 maxi |
| Plats protidiques ayant un rapport P/L ≤ 1 | | | | | | 2/20 maxi |
| Poissons ou préparations à base de poisson contenant au moins 70 % de poisson, et ayant un P/L ≥ 2 | | | | | | 4/20 mini |
| Viandes non hachées de bœuf, de veau ou d'agneau, et abats de boucherie | | | | | | 4/20 mini |
| Préparations ou plats prêts à consommer contenant moins de 70 % du grammage recommandé pour la portion de viande, poisson ou œuf | | | | | | - Enfants scolarisés et adolescents : 3/20 maxi - Adultes : 4/20 maxi |
| Légumes cuits, autres que secs, seuls, ou en mélange contenant au moins 50 % de légumes | | | | | | 10 sur 20 |
| Légumes secs, féculents ou céréales, seuls, ou en mélange contenant au moins 50 % de légumes secs, féculents ou céréales | | | | | | 10 sur 20 |
| Fromages contenant au moins 150 mg de calcium par portion (4) | | | | | | 8/20 mini |
| Fromages dont la teneur en calcium est comprise entre 100 mg et moins de 150 mg par portion (4) | | | | | | 4/20 mini |
| Laitages (produits laitiers frais, desserts lactés) contenant plus de 100 mg de calcium, et moins de 5 g de lipides par portion | | | | | | 6/20 mini |

Annexe 4.2 : Populations en métropole, fréquences de services des aliments pour les enfants scolarisés, les adolescents et les adultes (suite)

| Période du ... au ... (au moins 20 repas) | Entrée | Plat protidique | Garniture ou accompagnement | Produit laitier | Dessert | Fréquence recommandée |
|---|---------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------------------------|
| Desserts contenant plus de 15 % de lipides | | | | | | 3/20 maxi |
| Desserts ou laitages contenant plus de 20 g de glucides simples totaux par portion et moins de 15 % de lipides | | | | | | 4/20 maxi |
| Desserts de fruits crus 100 % fruit cru, sans sucre ajouté (5) | | | | | | 8/20 mini |

- (1) Ce tableau s'emploie pour le contrôle des fréquences de service des aliments en cas de menu unique, de choix dirigé, de menu conseillé, ou de libre-service.
- (2) Ces fréquences s'appliquent aux menus servis dans toutes les structures publiques de restauration (professionnelle, éducative, de soins, militaire,...).
- (3) dans le cas d'un internat, analyser séparément les déjeuners et les dîners
- (4) fromage servi en tant que tel, ou en entrée composée
- (5) Les salades de fruits surgelées, 100 % fruits, sont à prendre en compte si elles ne contiennent pas de sucre ajouté, et n'ont pas subi d'autre traitement thermique.