

Fiche //Entretien

Conservation des plantes adventices/plante hôte

Intérêt interaction écologique

01

Certaines plantes présentent un intérêt de conservation. Des zones spécifiques seront définies.



Zone de refuge :Talus G6.

Dans les zones de refuge identifiés, les orties seront conservées pour favoriser le développement des lépidoptères.

Fiche //Entretien/ Gestion des plantes sauvages

02

Plantes adventices/Invasives envahissantes avérées

Document est réalisé à partir de la liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes (PEE) d'Île-de-France fixée par le Conservatoire botanique national, du Bassin parisien, délégation Centre.

Dans un souci de gestion des plantes sauvages, l'EEEGHV met en place une politique d'intégration des plantes sauvages.

Cette fiche liste les plantes invasives ou envahissantes nécessitant une gestion spécifique sur le parc de la Villette.

1. *Crassula helmsii* (Kirk) Cockayne, 1907 Crassule de Helms Acc. 2 2006
2. *Hydrocotyle ranunculoides* L.f., 1782 Hydrocotyle fausse-renoncule Nat. (S.) 10 1990 X
3. *Ludwigia grandiflora* (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 / *Ludwigia peploides* (Kunth) P.H.Raven, 1963
4. *Jussies invasives* Nat. (S.) 12 1962 X
5. *Myriophyllum aquaticum* (Vell.) Verdc., 1973 Myriophylle aquatique Subsp. 7 1994 X
6. *Rhododendron ponticum* L., 1762 Rhododendron des parcs X Nat. (S.) 12 1990
7. ***Acer negundo* L., 1753 Erable negundo Nat. (S.) 146 1858**
8. *Azolla filiculoides* Lam., 1783
9. *Azolla fausse-fougère* Nat. (S.) 27 1937
10. ***Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, 1916 Ailante glanduleux Nat. (E.) 224 1883**
11. *Campylopus introflexus* (Hedw.) Brid. Mousse cactus Nat. (E.) ?
12. *Galega officinalis* L., 1753 Sainfoin d'Espagne Nat. (E.) 167 1799
13. *Heracleum mantegazzianum* Sommier & Levier, 1895 Berce du Caucase Nat. (S.) 36 1899 X
14. *Impatiens glandulifera* Royle, 1833 Balsamine de l'Himalaya Nat. (S.) 39 1905 X
15. *Laburnum anagyroides* Medik., 1787 Cytise faux-ébénier Nat. (E.) 206 1879
16. *Parthenocissus inserta* (A.Kern.) Fritsch, 1922 Vigne-vierge commune Nat. (E.) 190 1992
17. ***Prunus cerasus* L., 1753 Griottier X Nat 44 1906**
18. ***Prunus serotina* Ehrh., 1788 Cerisier tardif Nat. (S.) 65 1957**
19. *Reynoutria japonica* Houtt., 1777 / *Reynoutria sachalinensis* (F.Schmidt) Nakai, 1922 /
20. *Reynoutria x bohemica* Chrtek & Chrtkova, 1983 Renouée invasives Nat. (E.) 343 1928
21. ***Robinia pseudoacacia* L., 1753 Robinier faux-acacia Nat. (E.) 509 1878**
22. *Solidago canadensis* L., 1753 Solidage du Canada Nat. (E.) 317 1860
23. *Solidago gigantea* Aiton, 1789 Solidage glabre Nat. (E.) 161 1958
24. *Symphyotrichum* sp* Asters invasifs Nat. (S.) 105 1990
25. *Syringa vulgaris* L., 1753 Lilas X Nat. (S.) 76 1727
26. ***Artemisia verlotiorum* Lamotte, 1877 Armoise des frères Verlot Nat. (S.) 81 1821**
27. *Berberis aquifolium* Pursh, 1814 Mahonia faux-houx Nat. (E.) 187 1906
28. *Bidens frondosa* L., 1753 Bident à fruits noirs Nat. (S.) 99 1821
29. *Bromopsis inermis* (Leyss.) Holub, 1973 Brome sans-arêtes Nat. (S.) 99 1911
30. ***Buddleia davidii* Franch., 1887 Buddleia du père David Nat. (E.) 294 1923**
31. *Erigeron annuus* (L.) Desf., 1804 Vergerette annuelle Nat. (E.) 327 1871
32. *Erigeron canadensis* L., 1753 Vergerette du Canada Nat. (E.) 506 1876
33. ***Erigeron sumatrensis* Retz., 1810 Vergerette de Sumatra Nat. (E.) 297 1995**
34. *Helianthus tuberosus* L., 1753 Topinambour Nat. (S.) 21 1934
35. *Impatiens balfouri* Hook.f., 1903 Balsamine de Balfour Nat. (S.) 47 1943
36. *Impatiens capensis* Meerb., 1775 Balsamine du Cap Nat. (S.) 24 1727
37. *Lycium barbarum* L., 1753
38. *Lyciet commun* Nat. (S.) 30 1861
39. *Phytolacca americana* L., 1753 Raisin d'Amérique Nat. (S.) 113 1881
40. *Prunus laurocerasus* L., 1753 Laurier-cerise Nat. (E.) 200 1941
41. ***Senecio inaequidens* DC., 1838 Sénéçon du Cap Nat. (S.) 151 1989**
42. *Symphoricarpos albus* (L.) S.F.Blake, 1914 Symphorine à fruits blancs Subsp. 126 1906
43. ***Ambrosia psilostachya* DC., 1836 Ambroisie à épis grêles Nat. (S.) 3 2000**
44. *Asclepias syriaca* L., 1753 Herbe à la ouate Subsp. 3 1879 X
45. *Bothriochloa barbinodis* (Lag.) Herter, 1940 Barbon andropogon Acc. 1 2012
46. *Cornus sericea* L. Cornouiller soyeux 0
47. *Cortaderia selloana* (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 Herbe de la pampa Acc. 6 1998
48. *Cotoneaster horizontalis* Decne., 1879
49. *Cotonéaster horizontal* Subsp. 9 1948
50. *Fallopia baldschuanica* (Regel) Holub, 1971 Renouée du Turkestan Cult. 1 1998
51. *Glyceria striata* (Lam.) Hitchc., 1928 Glycerie striée Nat. (S.) 7 1849
52. *Lagarosiphon major* (Ridl.) Moss, 1928 Grand lagarosiphon Nat. (S.) 13 1998 X
53. *Lonicera japonica* Thunb., 1784 Chèvrefeuille du Japon Cult. 2 1996
54. *Myriophyllum heterophyllum* Michx.
55. *Myriophylle hétérophylle* 0 X
56. *Paspalum dilatatum* Poir., 1804 Paspale dilaté Nat. (S.) 1 2009
57. *Pterocarya fraxinifolia* (Poir.) Spach, 1834 Noyer du Caucase Cult. 1 2003
58. *Rhus typhina* L., 1756 Sumac hérissé Subsp. 10 2001 *Sporobolus indicus* (L.) R.Br., 1810
59. *Sporobole fertile* Nat. (S.) 17 1999

**Nota: Les plantes indiquées en gras sont
présentent sur le parc.**



Gestion à appliquer:

7- *Acer negundo* Erable negundo

Arrachage systématique plante complète	Gestion des pousses et rejets issues de graine	Signalement
	X	



10- *Ailanthus altissima* Ailante glanduleux

Arrachage systématique plante complète	Gestion des pousses et rejets issues de graine	Signalement
	X	

Attention système racinaire puissant à supprimer systématiquement des bords d'ouvrages.



17- *Prunus cerasus* Griottier

18- *Prunus serotina* Ehrh. Cerisier tardif

Arrachage systématique plante complète	Gestion des pousses et rejets issues de graine	Signalement
	X	



Gestion à appliquer:

19- Reynoutria japonica Houtt., & Reynoutria sachalinensis

20- Reynoutria x bohemica Renouée invasives

Arrachage systématique plante complète	Gestion des pousses et rejets issues de graine	Signalement
X	X	X

Plante hautement invasives



21- Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia

Arrachage systématique plante complète	Gestion des pousses et rejets issues de graine	Signalement
	X	



26- Artemisia verlotiorum Lamotte, Armoise des frères

Arrachage systématique plante complète	Gestion des pousses et rejets issues de graine	Signalement
X	X	X



30- Buddleja davidii , Buddleia du père David

Arrachage systématique plante complète	Gestion des pousses et rejets issues de graine	Signalement
	X	



Gestion à appliquer:

31- Erigeron annuus Vergerette annuelle

Arrachage systématique plante complète	Gestion des pousses et rejets issues de graine	Signalement
	X	X



32- Erigeron canadensis Vergerette du Canada

Arrachage systématique plante complète	Gestion des pousses et rejets issues de graine	Signalement
X	X	X



33- Erigeron sumatrensis Vergerette de Sumatra

Arrachage systématique plante complète	Gestion des pousses et rejets issues de graine	Signalement
X	X	X



41- Senecio inaequidens Séneçon du Cap

Arrachage systématique plante complète	Gestion des pousses et rejets issues de graine	Signalement
	X	X



Gestion à appliquer:

43- Ambrosia psilostachya Ambroise à épis grêles

Arrachage systématique plante complète	Gestion des pousses et rejets issues de graine	Signalement
X	X	X



00-Ambrosia artemisiifolia

Arrachage systématique plante complète	Gestion des pousses et rejets issues de graine	Signalement
X	X	X

Plante hautement allergisante à supprimer des zones fréquentées par le public.

Fiche //Entretien

Liste des plantes toxiques par noms latins

03

Dans un souci de gestion des plantes sauvages, l'EEEGHV met en place une politique d'intégration des plantes sauvages.

Cette fiche liste les plantes qui représentent un risque important pour le public en raison de sa toxicité et/ou de son côté attrayant.

- **A** - [Abrus precatorius L.](#) [Aconitum napellus L.](#) [Actaea spicata L.](#) [Adonis vernalis L.](#) [Aesculus hippocastanum L.](#) [Aethusa cynapium L.](#) [Agrostemma githago L.](#) [Ambrosia artemisiifolia L.](#) [Andromeda polifolia L.](#) [Anemone nemorosa L.](#) [Anemone pulsatilla L.](#) [Aristolochia clematitis](#) [Artemisia absinthium L.](#) [Arum italicum L.](#) [Arum maculatum L.](#) [Asparagus officinalis L.](#) [Atropa belladonna L.](#) [Aucuba japonica L.](#)
- **B** - [Berberis aquifolium Pursh](#) [Berberis vulgaris L.](#) [Brunfelsia pauciflora \(Cham. & Schltld.\) Benth](#) [Bryonia alba L.](#) [Bryonia dioica Jacq.](#) [Buxus sempervirens](#)
- **C** - [Calla palustris L.](#) [Calotropis procera \(Willdenow\)](#) [Cannabis sativa L.](#) [Catharanthus roseus L.](#) [Cephaelis ipecacuanha \(Brot.\) A. Rich., C. acuminata Karsten](#) [Chelidonium majus L.](#) [Cicuta virosa L.](#) [Cinnamomum camphora L.](#) [Citrullus colocynthis \(L.\) Schrader](#) [Clematis vitalba L.](#) [Clivia miniata L.](#) [Colchicum autumnale L.](#) [Conium maculatum L.](#) [Convallaria majalis L.](#) [Coriaria japonica L.](#) [Coriaria myrtifolia L.](#) [Cornus sanguinea L.](#) [Cornus stolonifera L.](#) [Cotoneaster horizontalis](#) [Cotoneaster ignavus](#) [Cotoneaster integerrimus](#) [Cotoneaster salicifolius](#) - **D** - [Daphne gnidium L.](#) [Daphne laureola L.](#) [Daphne mezereum L.](#) [Datura stramonium L.](#) [Delphinium staphisagria L.](#) [Dictamnus albus L.](#) [Dieffenbachia sp.](#) [Digitalis purpurea L.](#) [Dioscorea communis L.](#) [Duchesnea indica, Focke](#) - **E** - [Ephedra sinica Stapf](#), [Equisetum palustre L.](#) [Euonymus europaeus L.](#) [Euonymus japonicus Thunb.](#) [Euonymus latifolius](#) [Euphorbia pulcherrima WILLD.](#) - **F** - [Ferula communis L.](#)
- **G** - [Galanthus nivalis L.](#) [Gaultheria procumbens L.](#) [Ginkgo biloba L.](#) [Gratiola officinalis L.](#)
- **H** - [Hedera helix L.](#) [Helleborus spp. \(H. niger L., H. foetidus L.\)](#) [Hippomane mancinella L.](#) [Hyoscyamus niger L.](#)
- **I** - [Ilex aquifolium L.](#) [Iris foetidissima L.](#) [Iris Pseudacorus L.](#)
- **J** - [Juniperus sabina L.](#)
- **L** - [Laburnum anagyroides Medik.](#) [Ledum palustre L.](#) [Leucojum vernum](#) [Ligustrum vulgare L.](#) [Lonicera caprifolium L.](#) [Lonicera nigra L.](#) [Lonicera nitida](#) [Lonicera periclymenum L.](#) [Lonicera xylosteum L.](#) [Lupinus \(Tourn.\) L. sp.](#) [Lycium halimifolium Mill. ou L.](#)
- **M** - [Maianthemum bifolium L.](#) [Mandragora officinarum L.](#) [Mercurialis annua L.](#)
- **N** - [Narcissus pseudonarcissus L.](#) [Nerium oleander L.](#) [Nicotiana tabacum L.](#)
- **O** - [Oenanthe crocata L.](#)
- **P** - [Papaver somniferum L.](#) [Paris quadrifolia L.](#) [Parthenocissus quinquefolia L.](#) [Philodendron sp.](#) [Physalis alkekengi L.](#) [Physostigma venenosum Balf.](#) [Phytolacca decandra L.](#) [Phytolacca esculenta Roxb.](#) [Polygonatum odoratum \(Mill\) Druce](#) [Polygonatum verticillatum](#) [Prunus laurocerasus L.](#) [Pyracantha sp.](#)
- **R** - [Ranunculus sp.](#) [Rauwolfia sp. L.](#) [Rhamnus cathartica L.](#) [Rhamnus frangula L.](#) [Rhododendron sp.](#) [Ricinus communis L.](#) [Rosa canina L.](#) [Ruscus aculeatus L.](#) [Ruta graveolens L.](#)
- **S** - [Sambucus ebulus L.](#) [Sambucus nigra L.](#) [Sambucus racemosa L.](#) [Saponaria officinalis L.](#) [Senecio vulgaris L.](#) [Skimmia japonica Thumb.](#) [Solanum dulcamara L.](#) [Solanum lycopersicum L.](#) [Solanum nigrum L.](#) [Solanum pseudocapsicum L.](#) [Solanum tuberosum L.](#) [Solanum villosum Mill.](#) [Sorbus aucuparia L.](#) [Spartium junceum L.](#) [Streptopus amplexifolius L.](#) [Strophanthus sp.](#) [Symphoricarpos albus \(L.\) S.F. Blake](#) -
- **T** - [Taxus baccata L.](#) [Teucrium chamaedrys L.](#) [Thevetia peruviana \(Pers.\) K SCHUMANN](#) [Thuja occidentalis L.](#) [Toxicodendron radicans \(L.\) Kuntze](#) [Tulipa sp.](#)
- **U** - [Urginea maritima L. BAKER](#)
- **V** - [Veratrum album L.](#) [Viburnum lantana L.](#) [Viburnum opulus L.](#) [Viburnum rhytidophyllum](#) [Viburnum tinus L.](#) [Viburnum X fragrans](#) [Vinca minor L.](#) [Viscum album L.](#)
- **W** - [Wisteria chinensis Nuttall.](#)

Fiche //Entretien

Plantes hautement toxiques




TOXICITE



RISQUE PAR CONTACT

Attention aux moutons et chèvres. Plantes toxiques pour les animaux.



1- *Solanum nigrum*, Morelle noire

Arrachage systématique plante complète	Gestion des pousses et rejets issues de graine	Signalement
	X	X

La morelle noire, *Solanum nigrum*, est une plante herbacée de la famille des Solanacées. Il s'agit d'une "mauvaise herbe" extrêmement commune du bord des chemins, dans les champs incultes et dans les champs de maïs fourrager. La plante atteint une hauteur maximum d'environ 60 cm. La floraison s'étale de juin à novembre, avec de petites fleurs blanches. La fructification se déroule à l'automne avec des baies sphériques jaunes verdâtres qui deviennent noires à maturité. Les feuilles sont alternes, simples à bords dentés. Cette plante est souvent résistante aux herbicides utilisés dans les cultures de maïs fourrager.

Les intoxications à la morelle noire concernent principalement les animaux de production : bovin, porcin, volailles. La plante est ingérée sèche ou dans l'ensilage, mais rarement fraîche car l'odeur est dissuasive. Les intoxications à la morelle noire existent chez les animaux de compagnie mais sont beaucoup plus rares.

Le Centre Anti-Poison Animal et Environnemental de l'Ouest reçoit une petite dizaine d'appels par an à propos de la morelle noire. La toxicité est plus élevée dans les fruits non mûrs et l'écorce des tiges. Au contraire, les fruits bien mûrs sont sans danger. Cette toxicité s'explique par la présence de glucoalcaloïdes en particulier **la solanine**. La teneur en glucoalcaloïdes, et donc la toxicité, varie selon la saison et l'endroit où la plante a poussé.

L'apparition de symptôme survient généralement après **ingestion prolongée sur plusieurs jours**. Les doses toxiques sont encore mal connues. Concernant l'ensilage, deux pieds de morelle noire par m² suffisent à provoquer une intoxication chez les bovins. Les signes cliniques observés sont des **troubles digestifs** qui peuvent être sévères : l'animal ne mange plus, présente une diarrhée et des douleurs abdominales. Dans les cas graves s'ajoutent des troubles nerveux : tristesse, fatigue, incoordination des mouvements... ainsi qu'une accélération cardiaque et respiratoire.

Il n'y a pas d'antidote, mais on peut mettre en place un traitement général. La prévention consiste en l'arrachage des plantes toxiques avant la réalisation de l'ensilage.

Fiche //Entretien

Plantes hautement toxiques



Par Guido Gerding [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons



2- *Solanum dulcamara* (Douce amère)

Arrachage systématique plante complète	Gestion des pousses et rejets issues de graine	Signalement
X	X	X

Habitat et fréquence

Sols argileux, humides, riches en nutriments : haies, bois, jardins, fossés, bords des chemins,
Climat Eurasiatique-subméditerranéen à des altitudes pouvant être élevées.

Caractéristiques générales de la plante, des feuilles et des fleurs

Plante pérenne grimpante, mi-arbuste, sarmenteuse, atteignant 0,3 à 1,8 m de hauteur, possédant une tige volubile arrondie ou rampante, souple, dont les parties inférieures se lignifient en général l'hiver. Feuilles d'un vert assez foncé, alternes, pétiolées, cordiformes à la base et à 3 lobes inégaux au sommet de la tige (lobe terminal pointu plus grand que les 2 latéraux). Tiges de 2-3 m de long. Fleurs disposées en cymes scorpioïdes penchées, longuement pédonculées (en fin mai -septembre). La corolle a des pétales violets, rarement blancs, brièvement tubuleux et courbés vers le bas, aigus avec des étamines jaunes groupées au centre (anthères). 2 tâches vertes ou jaunes sont disposées à la base des pétales.

Forme et maturation du fruit

Baies ovales, glabres, arrondies, de 6-8 mm, à pulpe molle, biloculaires, renfermant avec nombreuses graines aplaties réniformes à la saveur amère de prime abord puis légèrement sucrée. Les fruits, rouges à maturité, forment de petites grappes pendantes.

Toxicité

La plante est hautement toxique en particulier feuilles et fruits.

TOXICITE



RISQUE PAR CONTACT

Fiche //Entretien

Plantes hautement allergène



TOXICITE



RISQUE PAR CONTACT



3 - Ambrosia artemisiifolia (Ambrosie à feuille d'armoise)

Arrachage systématique plante complète	Gestion des pousses et rejets issues de graine	Signalement
	X	X

Habitat et fréquence

L'absinthe du Canada a été introduite en France avec les graines de trèfles vers 1863. Elle s'adapte parfaitement sur les sols pauvres en humus et en argile : les bords de rivières, les lieux incultes, les terrains vagues et de chantiers, les rues, les places de village, parfois sur le long des autoroutes ou des aéroports. C'est une mauvaise herbe commune dans la vallée du Rhône.

Caractéristiques générales de la plante, des feuilles et des fleurs

Cette plante herbacée annuelle mesure de 40 à 120 cm et, par son allure générale, présente une vague ressemblance avec le Chanvre. Elle possède des tiges rougeâtres, cannelées, duveteuses, qui portent un feuillage vert franc, inodore dont les feuilles supérieures sont alternes et les feuilles inférieures sont opposées, très découpées. De août à octobre sur un même plant, on trouve des fleurs mâles, verdâtres, réunies en petits capitules rabattus, pendants, possédant de multiples étamines libérant des grains de pollen et des fleurs femelles à pistil, groupées en capitules globuleux, dressés, situés à l'aisselle des feuilles. Chaque pied produit près de 3000 graines, qui peuvent rester en dormance pendant 7 ans dans le sol.

Forme et maturation du fruit

Les fruits sont des akènes verdâtres violacés, ovoïdes, petits (4 à 5 mm), coriaces portant au sommet 5 à 6 épines courtes.

Toxicité

Toute la plante est faiblement toxique mais extrêmement allergisante par ses pollens.

Risque par ingestion/Fruits

Les plantes encadrées en rouge sont présentes sur le parc.



Aconit napel



Aconit tue-loup



Actée en épi



Akée



Arisarum



Aristolochie clématite



Arum tacheté



Arum d'Italie



Asperge officinale



Asperge à f. pointues



Asperge à f. de myrte



Aucuba



Belladone



Bois gentil



Bourdaine



Brugmensia



Bryone dioïque



Bryone Blanche



Calla des marais



Camélée



Camerisier noir



Chèvrefeuille des bois



Chèvrefeuille des haies



Chèvrefeuille luisant



Chèvrefeuille des jardins



Clivie



Coloquinte



Coque du levant



Cornouiller décoratif



Cornouiller sanguin



Coronille variée



Cotoneaster commun



Cytise



Daphné lauréole



Dictame Blanc



Digitale



Ephedra



Euphorbes



Fève de Calabar



Fragon épineux



Fraisier d'Inde



Fusain du Japon



Fusain à larges feuilles



Fusain d'Europe



Garou



Genévrier



Gesses



Ginkgo



Gloriosa



Glycine



Gui



Houx



If



Ipeca



Iris des marais



Iris fétide



Jasmin d'été



Jasmin de nuit



Jasmin Jaune



Jatropha



Jéquirity



Jusquiame



Lampourdes



Lantanier



Laurier cerise



Laurier Jaune



Laurier tin



Lierre



Lis maritime



Lupins



Lyciet commun



Mahonia



Maianthemum à 2 feuilles



Lilas des Indes



Mancenillier



Mandragore



Margose à piquants



Morelle douce amère



Morelle jaune



Morelle noire



Muguet



Nerprun



Parisette



Pavot



Phytolaque



Pomme de terre



Pommier d'Amour



Pyracantha



Raisin d'Amérique



Rauwolfia



Redoul



Ricin



Sceau de Salomon



Sceau de Salomon verticillé



Skimmia japonica



Sorbier des oiseleurs



Stramoine épineuse



Streptope



Sureau hièbe



Symphorine blanche



Tamier



Tomate cerise



Troène



Véatré Blanc



Vigne vierge



Viorne mancienne



Viorne obier



Viorne ridée

Risque par ingestion/par contact/photosensibilisation



Achillée millefeuille
Achillea millefolium L.



Ambroisie à f. d'armoise
Ambrosia artemisiifolia L.



Ammi élevé
Ammi majus L.



Angélique
Angelica archangelica L.



Armoise commune
Artemisia vulgaris L.



Arnica
Arnica montana L.



Artichaut
Cynara scolymus L.



Bergamotier
Citrus bergamia Riss. & Poit.



Berce géante
Heracleum sosnowskyi M.



Berce géante du Caucase
Heracleum mantegazzianum



Berce spondyle
Heracleum sphondylium L.



Bigaradier
Citrus aurantium L.



Bushrue
Cneoridium dumosum Hook.



Camomille romaine
Chamaemelum nobile L.



Carotte sauvage
Daucus carota L.



Cédration
Citrus medica L.



Céleri
Apium graveolens L.



Chicorée
Cichorium intybus L.



Chrysanthèmes
Chrysanthemum sp.



Citronnier
Citrus limon L.



Clémentinier
Citrus clementina Hort.



Combava
Citrus hystrix DC.



Dahlias
Dahlias sp.



Dictame blanc
Dictamnus albus L.



Endives
Cichorium intybus convar.



Echinacée
Echinacea Moench



Fenouil commun
Foeniculum vulgare Miller



Figuier
Ficus carica L.



Grande aunée
Inula helenium L.



Grande camomille
Tanacetum parthenium L.



Khella
Ammi visnaga L.



Laitue
Lactuca sativa L.



Laurier noble
Laurus nobilis L.



Limettier
Citrus aurantifolia Swingle



Magnolia à grandes fleurs
Magnolia grandiflora L.



Mandarinier
Citrus deliciosa Ten.



Millepertuis
Hypericum perforatum L.



Oranger doux
Citrus sinensis L.



Pâka
Urena lobata L.



Panais cultivé
Pastinaca sativa L.



Parthenium hysterophorus
Parthenium hysterophorus L.



Persil
Petroselinum sativum Hoffm.



Pissenlit
Taraxacum officinalis



Pomelo
Citrus paradisi Macf.



Psoralier
Psoralea corylifolia L.



Rue fétide
Ruta graveolens L.



Sarrasin
Fagopyrum esculentum M.



Tournesol
Helianthus annuus L.



Verveine
Lippia citriodora L.