



Mode opératoire	Référence : CPN-CLI-MOP-0095
Précautions complémentaires	Version : 07
« Respiratoires »	Date (de cette version) : Décembre 2024
	Page 1 sur 2

Service émetteur : EOH

Délai de révision : *tous les 5 ans*

Validation : COPIL « Vigilances et Sécurité des Soins » - Février 2025

	PRECAUTIONS RESPIRATOIRES SIMPLES	PRECAUTIONS RESPIRATOIRES RENFORCEES
	Tout pathogène sauf tuberculose sensible, varicelle, rougeole <u>Bactéries :</u> . Streptococcus pneumoniae . Bordella pertussis (Coqueluche) . Haemophilus Influenza (Infections respiratoires et méningites) . Mycoplasme pneumoniae <u>Virus :</u> . Myxovirus para influenzae paroditis (Oreillons) . Adénovirus . Virus influenza (grippe) . Virus respiratoire syncytial (bronchiolite...) . SARS- Co- V2 (Covid-19) . Rhinovirus, coronavirus saisonniers hors SARS-CoV-2 . Rubivirus (Rubéole)	Uniquement pathogènes : <u>Bactéries :</u> . Mycobacterium tuberculosis sensible (Tuberculose) <u>Virus :</u> . Varicelle (Varicelle et zona disséminé chez l'ID) . Virus de la rougeole
MESURES	En complément des précautions standard et Sur prescription médicale : Prescription médicale des précautions complémentaires (BMR, Germes cibles) – CPN CLI ENR 0126	
Chambre	- Individuelle - Médicalisée avec SAS recommandée - Porte fermée - Le patient porte un masque médical dès qu'une personne entre dans sa chambre	
Sorties de chambre	Encadrées	Limitées au strict nécessaire (réalisation d'un examen indispensable en évitant l'attente en présence d'autres patients)
Masque	PATIENT	
	Port du masque chirurgical dès la sortie de chambre, entrée en établissement de santé, consultation...	Masque FFP2 En cas de difficulté de port de masque FFP2, un masque chirurgical peut être toléré
	PROFESSIONNEL/VISITEUR	
	Masque chirurgical - Avant d'entrer dans la chambre - A retirer après la sortie de chambre	Masque FFP2 - Avant d'entrer dans la chambre - A retirer après la sortie de chambre
Visites	Autorisées	Limitées et strictement encadrées
Soins à risque de génération d'aérosols et port de masque	Risque modéré : port de masque selon le pathogène : - Aspiration trachéale - Chirurgie dentaire avec appareil rotatif Risque élevé : port de masque FFP2 quel que soit le pathogène : - Intubation - Réanimation cardio pulmonaire - Ventilation manuelle au masque facial - Kinésithérapie respiratoire associée ou non à une aérosolthérapie	