Émetteur du Protocole : Comité lutte contre infections nosocomiales EOH	Réf. Ennov Doc : **PTC / 2513**
MAINTENANCE DES TRAPPES DE DÉSENFUMAGE **Recommandations d'hygiène**	Version : 2
	Date d'application : **Juin 2023**
	Annexe : Non Lien :Non
Motif mise à jour : *Création*	

1. Objectif:

Prévenir le risque aspergillaire.

2. Cible

Patients à risque aspergillaire :

- ✓ Patient ayant:

  - une cure d'induction ou de consolidation de leucémie aiguë myéloïde (LAM) ou de syndrome myélodysplasique acutisé (SMD)
  - une allogreffe de cellules-souches hématopoïétiques (CSH)

- ✓ Patient neutropénique (<500PNN/mm3) pendant une durée supérieure à 10 jours
- ✓ Greffe pulmonaire, cardiaque, foie, rein, pancréas, intestin en cas de complications postopératoires ou de séjour prolongé en réanimation
- ✓ Déficit immunitaire cellulaire congénital
- ✓ Corticothérapie à forte dose et traitement prolongé (> 5mg/kg de prednisone pendant une durée ≥ 5 jours ou 0,5 mg/kg de prednisone pendant 30jours)

3. En amont:

1. Dans chaque service, le médecin devra évaluer le statut immunitaire des patients.

→Si un **patient à risque aspergillaire** doit sortir de sa chambre : cf. Page suivante.

2. L'équipe d'intervention se présentera la veille des travaux au cadre du service pour voir les contraintes liées au service et organiser les horaires d'intervention.

3. Ne pas planifier de travaux pendant :
   - Le service alimentaire
   - Les départs-retours au bloc opératoire

4. Avertir les différents intervenants extérieurs (brancardiers, pharmacie, radiologie…) de maintenir fermées les portes du service pendant les tests.

4. Pendant toute la durée des tests :

Lieu de l'intervention	Recommandations
Les couloirs	- Fermer les portes du palier - Fermer toutes les portes du service - Déménager le matériel se trouvant dans la zone d'intervention, si impossible le protéger avec des draps - Draps humides : ➢ En bas des portes proches de la zone d'intervention ➢ En bas de la porte d'un patient à risque ➢ Sous la trappe pendant la durée du test (retenir les poussières) - Bionettoyage du sol après intervention : ➢ Balayage des sols ➢ Lavage des sols : o Microfibre et eau pour les secteurs standard o Microfibre et détergent-désinfectant type Surfanios® pour les secteurs à environnement maitrisé ➢ Bionettoyage à renouveler dans les 6h (redéposition des poussières) - Pour tout patient passant dans le couloir Si transport en lit (ex : examen): drap supplémentaire sur le lit et Disposer un sac pour le linge sale à la sortie du service; prévenir les brancardiers qu'ils devront retirer le drap sans le secouer puis le jeter dans ce sac à la sortie du service - Si patient à risque aspergillaire sort de sa chambre: port d'un masque **FFP2**